

ETIOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LA HEMOPTISIS

Rojas Mendiola R., Saborido S., Castro Justo C., Benedetti D., Gonzalez J. A.

División Neumonología. Hospital E. Tornú. Buenos Aires

Objetivo

Identificar las causas prevalentes de hemoptisis y su manejo en pacientes internados en la División Neumonología durante el periodo de Julio 2010 a Junio 2013.

Material y métodos

Estudio retrospectivo y descriptivo en base a pacientes internados en dicho período identificando aquellos que tuvieran como síntoma hemoptisis al momento de su ingreso. Se analizaron los diagnósticos y el manejo de cada paciente, la resolución y la recurrencia del cuadro posteriormente al alta.

Resultados


Pacientes internados: 1190

Pacientes con hemoptisis: 108 (9.07 %)


Edad media: 53.2 años

Edad mediana: 54.5 años


Rango: 18 a 84 años




Etiología de la hemoptisis



Rescate bacteriológico



Tratamiento



- Recurrencia de hemoptisis durante el periodo de estudio: 11,11%

Discusión y Conclusiones

- Se demuestra la prevalencia de las exacerbaciones de bronquiectasias como causa de hemoptisis
- Las causas de origen neoplásico constituyen la segunda causa y en general son leves y no suele ser la causa de muerte en estos pacientes
- La hemoptisis es un motivo frecuente de consulta siendo en muchos casos de difícil manejo.
- La Tuberculosis pulmonar como enfermedad activa o como secuela continúa siendo una entidad prevalente a diferencia de los estudios y de la bibliografía de los países desarrollados.