100

CARCINOMA DE CÉLULAS PEQUEÑAS: FORMA DE PRESENTACION INFRECUENTE.

Residencia de Neumonología - HIEA y C San Juan de Dios de La Plata

AUTORES: Andersson R, Torres C, Braggio C, Lardizabal A, Fernandez A, Demarchi Juan P, Chirino M, Pellegrino G.

INTRODUCCION: Las metástasis cutáneas son las manifestaciones dermatológicas menos frecuentes del cáncer de pulmón, con una incidencia del 0,6 al 7,4 %. Siendo un signo tardío en la evolución de la mayoría de las neoplasias y cuando se presentan se acompañan de un pronóstico ominoso.

CASO CLINICO: Varón de 53 años, tabaquista de 70 p/año, enolista severo, derivado a nuestro hospital por hallazgo en la Rx de tórax de una masa perihiliar derecha. Al examen físico, paciente en regular estado general, hemodinámicamente estable, adelgazado, afebril. Se evidenciaba a la inspección en la comisura labial derecha lesión eritematosa, exofitica, indurada, indolora, de aproximadamente 20 días de evolución. Aparato respiratorio presentaba aceptable mecánica ventilatoria, buena entrada de aire en hemitórax izquierdo, hipoventilación en hemitórax derecho a predominio de la base.

ESTUDIOS SOLICITADOS:





Fibrobroncoscopia: cuerdas vocales, traquea y carina normal, LSD sin obstrucción, LM totalmente obstruido, LID pierde totalmente la anatomía, se toman biopsias.
Se realiza simultáneamente biopsia de la lesión de piel del labio superior.

INFORME ANATOMOPATOLOGICO: células neuro-endocrinas compatibles con carcinoma de células pequeñas.

CONCLUSION: este caso corresponde a una forma de presentación infrecuente del carcinoma de células pequeñas, por lo que concluímos que debe descartarse siempre secundarismo cutáneo en todo paciente que presente cáncer de pulmón confirmado, o sospecha del mismo.