


FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RETRASOS EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN

Itcovici N, Jordan P, Heres M, Lamot S, Solís M, Villa J, Hernández M, Quadrelli S

Materiales y Métodos

Estudio prospectivo. Casos nuevos diagnósticos de CPNPC de forma consecutiva durante un año. El retraso se calculó como: (a) comienzo de los síntomas hasta el día de consulta a un médico de cabecera, (b) comienzo de los síntomas hasta el día de consulta a un especialistas, (c) comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico, (d) diagnóstico hasta comienzo del tratamiento, (e) comienzo de los síntomas hasta comienzo del tratamiento.



Conclusiones

Los retrasos entre el inicio de síntomas y la primera cita con un médico son un problema común entre los pacientes y son influenciados por razones socioeconómicas. Los tiempos de retraso entre la primera visita a un médico y el diagnóstico son mayores al recomendado. La conformación de un equipo multidisciplinario junto con una formación de médicos y pautas de referencia pueden acortar los tiempos de retraso del diagnóstico y el inicio del tratamiento. La disminución del retraso del paciente puede ser más difícil de aplicar en el sector de la salud.

NEUMONOLOGIA

